

Vergeet niet je naam op te schrijven en schrijf netjes. Licht je afleidingen toe. Succes!

1. Gegeven is de eerste-orde differentiaalvergelijking

$$(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} = xy + x$$

- a) Los de vergelijking op met behulp van scheiden van variabelen.
- b) Geef de oplossing van het beginwaardeprobleem $y(0) = 4$.
- c) **Bonus** Los deze vergelijking ook op met de integrerende factor methode.

2. Gegeven is de volgende integraal

$$\int \frac{x}{9 - x^2} dx$$

- a) Los de vergelijking op met behulp van **breuksplitsen** (*Hint: gebruik het 'merkwaardig product'*).
- b) Los de vergelijking ook op met behulp van een **goniometrische substitutie**.

3. Indien er geen warmtebronnen in een systeem aanwezig zijn voldoet de temperatuurverdeling aan de zogenaamde Laplace vergelijking

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Laat zien dat de functie $T(x, y) = e^x \sin y + x^2 - y^2$ een oplossing is van de Laplace vergelijking.

4. a) Een driehoek heeft hoekpunten op A , B en C waarbij $A = (1, 1, 2)$, $B = (0, 0, 0)$ en $C = (1, 2, 3)$. Bereken de oppervlakte van deze driehoek.

Gegeven zijn de vectoren $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - \mathbf{k}$ en $\mathbf{w} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.

- b) Laat zien dat $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v}$
- c) Bepaal de hoek tussen \mathbf{u} en \mathbf{v} exact.

5. Gegeven is de volgende tweede-orde homogene differentiaalvergelijking

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = 0$$

met constanten $p, q \in \mathbb{R}$.

- a) Geef de oplossing van de vergelijking indien $p = 2$ en $q = 1$ met randvoorwaarden $y(0) = 0$ en $y'(0) = 1$.
- b) Laat zien dat als $p = 0$ en $q < 0$ de algemene oplossing gegeven wordt door $y(x) = C_1 e^{\sqrt{-q}x} + C_2 e^{-\sqrt{-q}x}$.
- c) Gegeven is dat $q > 0$. Voor welke waarden van p heeft de vergelijking oplossingen in de vorm $y(x) = e^{ax}(C_1 \sin(bx) + C_2 \cos(bx))$

6. Gegeven is de functie

$$f(x, y) = \frac{4x^3 - 4y^2}{2x^2 - xy}$$

a) Bereken de de limiet

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

via de verzameling rechte lijnen $y = kx$, met $k \in \mathbb{R}$.

b) Beredeneer met behulp van je antwoord bij a) of de functie $f(x, y)$ continu is in $(0,0)$.